

Orden de 15 de enero de 2016 por la que se convoca el turno de ascenso para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

D.O.E. número 12, de 20 de enero de 2016

TRIBUNAL Nº 23

TURNO DE ASCENSO

GRUPO III

CATEGORÍA MAYORAL

PRIMER EJERCICIO: CUESTIONARIO TIPO TEST



Mérida, 29 de septiembre de 2016



- 1.- El artículo 4.1 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, establece que las vías pecuarias se denominan, con carácter general:
 - a. Caminos públicos y privados.
 - b. Abrevaderos, descansaderos y demás lugares asociados al tránsito y uso ganadero.
 - c. Urbana, interurbana y convencional.
 - d. Cañadas, cordeles y veredas.

- 2.- ¿Qué raza de la especie ovina es más numerosa en Extremadura?
 - a. Castellana.
 - b. Manchega.
 - c. Merina.
 - d. Churra.

- 3.- ¿En qué consiste el sistema reproductivo "STAR"?
 - a. En un sistema de 1 parto al año.
 - b. En un sistema de 2 partos al año.
 - c. En un sistema de 3 partos en dos años.
 - d. En un sistema de 5 partos en tres años.

- 4.- De los siguientes granos de cereales, ¿cuál es el más utilizado en la ración de concentrados para la alimentación del ganado ovino?
 - a. Trigo.
 - b. Avena.
 - c. Centeno.
 - d. Sorgo.

- 5.- Según su aparato digestivo, el ganado equino se clasifica como:
 - a. Herbívoro monogástrico.
 - b. Herbívoro rumiante.
 - c. Omnívoro poligástrico.
 - d. Omnívoro digástrico.

- 6.- En condiciones normales, la alimentación de las vacas en régimen extensivo, padece deficiencias alimenticias importantes sobre todo en:
 - a. Primavera.
 - b. Verano.
 - c. Otoño.
 - d. Invierno.

- 7.- En los etiquetados de los productos procedentes del cerdo ibérico, se denomina "jamón de recebo"
 - a. El procedente de cerdos alimentados únicamente con bellota.
 - b. El procedente de cerdos alimentados con piensos y terminados con bellotas.
 - c. El procedente de cerdos alimentados únicamente con pienso.
 - d. El término "recebo" está prohibido.

- 8.- El ciclo estral comienza con la fase denominada:
 - a. Estro.
 - b. Diestro.
 - c. Proestro.
 - d. Metaestro.



- 9.- En un parto animal, para que se lleve a cabo la expulsión del feto es necesario que:
- El cérvix se contraiga.
 - El útero pase a ser un órgano contráctil.
 - El útero siga siendo un órgano quiescente.
 - El útero permanezca firmemente cerrado.
- 10.- Con respecto a la lactancia artificial de los corderos:
- Cuanto más tarde es retirado el cordero de su madre mejor es su adaptación a la lactancia artificial.
 - El alargamiento de la fase de adaptación lleva consigo un aumento en el crecimiento.
 - Se deben mezclar corderos con una diferencia de edad de más de una semana.
 - Durante el periodo de aprendizaje conviene hacer grupos de unos 12-15 corderos de edad homogénea.
11. En una instalación de ordeño, ¿qué válvula es la encargada de mantener un vacío estable?
- El pulsador.
 - Tanque de vacío.
 - Vacuómetro.
 - Regulador.
- 12.- En las granjas de ganado porcino de Extremadura, es obligatorio:
- La disposición de vestuario para el personal.
 - Que los muelles de carga y descarga se sitúen de tal forma que la carga se realice desde dentro del recinto donde se alojen las naves.
 - Contar con lazaretos comunicados con las naves de secuestro.
 - Disponer de horno crematorio para deshacerse de los cadáveres.
- 13.- Los programas de mejora animal tienen como objeto la conservación, mejora y/o fomento de una raza. ¿Cómo pueden ser estos programas?
- De selección o de conservación.
 - De selección y reproducción.
 - De selección, conservación y reproducción.
 - De conservación y explotación.
- 14.- En general, ¿cuál es la edad aproximada para la tiente en las hembras pertenecientes a la raza "bovino de lidia"?
- Añoja.
 - Erala.
 - Utrera.
 - Cuatreña.
- 15.- La ganadería extensiva está formada, fundamentalmente, por:
- Razas extranjeras incorporadas al medio.
 - Cerdos ibéricos, únicamente.
 - Razas autóctonas perfectamente adaptadas al medio.
 - Los productos de la caza.



16.- Según el art. 11.1 del Real Decreto 1980/1998 que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina, en el caso de muerte de un animal en la explotación, el documento de identificación será restituido por el poseedor a la autoridad competente, dentro de los:

- a. 15 días siguientes a dicho acontecimiento.
- b. 3 meses.
- c. 40 días siguientes a dicho acontecimiento.
- d. 7 días siguientes a dicho acontecimiento.

17.- ¿Qué número mínimo de animales hace falta para poseer una explotación equina?

- a. Dos caballos y un asno o mula.
- b. Un caballo, un asno y una mula.
- c. Un animal equino.
- d. Cuatro animales equinos.

18.- ¿Por qué motivo se encuentra en peligro de extinción la cabra retinta en Extremadura?

- a. Por su baja rusticidad.
- b. Por su falta de adaptación a terrenos marginales.
- c. Por su falta de instinto maternal.
- d. Por su baja producción láctea.

19.- ¿Cuál de las dos provincias extremeñas alberga un mayor número de ganaderías de ganado bovino de lidia?

- a. Cáceres.
- b. Badajoz.
- c. Las dos provincias por igual.
- d. No hay ganaderías de bovino de lidia en Extremadura.

20.- Según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado Bovino de España, ¿cuál de las siguientes razas se encuentra en peligro de extinción?

- a. Morucha (variedad negra).
- b. Asturiana de los Valles.
- c. Parda.
- d. Rubia gallega.

21.- Es una raza de la especie ovina:

- a. Talaverana.
- b. Verata.
- c. Manchado de Jabugo.
- d. Limusina.

22.- El proceso de elaboración de los jamones y las paletas ibéricas constará de las siguientes fases:

- a. Adobado y curación.
- b. Adobado y embutido en tripas naturales o artificiales.
- c. Salazón, lavado, post-salado y curado-maduración.
- d. Troceado de las piezas osteomusculares, adobado y embutido.

23.- Dentro de la raza del porcino ibérico en peligro de extinción está el "manchado de jabugo", ¿por qué motivo?

- a. Por el excesivo engrasamiento de sus piezas nobles.
- b. Por tener una capa rubia o blanquecina (amarillenta).
- c. Por tener la pezuña blanquecina.
- d. Por tener un índice de conversión inferior al de otras razas.

24.- Cuando el documento de movimiento de ganado sea emitido por la autoridad competente con carácter previo al mismo y con posterioridad a dicha emisión, por circunstancias excepcionales y motivadas, los datos relativos al número de animales sea diferente:

- a. Se podrán añadir hasta un máximo de 10 animales.
- b. Podrá ser superior o inferior al inicialmente solicitado.
- c. Sólo podrá ser superior al inicialmente solicitado.
- d. Sólo podrá ser inferior al inicialmente solicitado.

25.- El Real Decreto núm. 2129/2008 define como raza autóctona en peligro de extinción aquella:

- a. De la que quedan menos de 1000 ejemplares.
- b. Que se registra en el MAGRAMA como raza autóctona en peligro de extinción.
- c. Que se encuentra en grave regresión o en trance de desaparición.
- d. En la que el censo a nivel nacional desciende de forma alarmante.

26.- Respecto al mantenimiento y mejora de pastos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a. El sobrepastoreo aumenta la diversidad.
- b. La diversidad de los pastos no se ve afectada con el pastoreo.
- c. Con una carga ganadera adecuada se favorece el consumo de especies menos apetecibles.
- d. Aumentando la presión de pastoreo aumenta la abundancia de las especies dominantes.

27.- Según la Norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, la edad mínima al sacrificio para animales que dan origen a productos con la designación "de bellota", será:

- a. 10 meses.
- b. 12 meses.
- c. 14 meses.
- d. 16 meses.

28.- La absorción de las sustancias nutritivas asimilables se realiza sobre todo en:

- a. El estómago.
- b. El intestino delgado.
- c. La panza.
- d. El esófago.

29.- ¿En qué tramo del aparato digestivo del ganado equino se realiza la digestión de la fibra?

- a. En el rumen.
- b. En el intestino delgado.
- c. En el estómago.
- d. En el intestino grueso.

- 30.- Para evitar el "meteorismo" o "timpanización" conviene:
- Que los animales pasten en praderas de leguminosas con muchos brotes tiernos.
 - Que los animales pasten cuando las plantas tengan mucho rocío.
 - Que los piensos concentrados estén formados por partículas gruesas.
 - Cambiar de un tipo de alimentación a otro de forma drástica.
- 31.- El arbolado en la dehesa está constituido, especialmente, por:
- Pinos.
 - Robles.
 - Encinas.
 - Olivos.
- 32.- Si hablamos de los contenidos nutritivos de la miel, ¿cuál excluiríamos?
- Sales minerales
 - Azúcares.
 - Grasas.
 - Vitaminas.
- 33.- El ganado caprino es considerado como:
- Animal poliéstrico estacional.
 - Animal monogástrico estacional.
 - Animal monoéstrico.
 - Animal omnívoro.
- 34.- Respecto de la lactación animal:
- La localización de las glándulas mamarias en las vacas están en el tórax.
 - Las glándulas mamarias en las vacas se dividen en gestoma y tejido excretor.
 - Las áreas especializadas donde se almacena la leche en las vacas se llaman cisternas.
 - En las vacas, las cisternas, se abren al exterior a través de un conducto nasolagrimal.
- 35.- En el ordeño mecánico, ¿cuál de los siguientes elementos de la instalación se halla en contacto directo con el animal?
- El pulsador.
 - El manguito de ordeño.
 - El regulador.
 - El colector.
- 36.- Según el artículo 1.2 de la Ley de Vías Pecuarias, de 23 de marzo, se entiende por vías pecuarias:
- Todos los caminos rurales por los que discurre el ganado.
 - Las vías interurbanas destinadas al tráfico agrícola.
 - Los caminos privados habilitados para el transporte del ganado.
 - Las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurrendo tradicionalmente el tránsito ganadero.
- 37.- La provincia española con mayor número de animales de la especie porcina, raza ibérica es:
- Salamanca.
 - Lérida.
 - Toledo.
 - Badajoz.



38.- Según el Real Decreto 4/2014, la entrada a la montanera para los animales que dan origen a productos con la designación "de bellota", deberá realizarse:

- a. A partir del 15 de diciembre.
- b. Entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre.
- c. Entre el 1 de marzo y el 15 de septiembre.
- d. Entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre.

39.- ¿Cuál de las siguientes razas de la especie ovina tiene el vellón más denso?

- a. Segureña.
- b. Merina.
- c. Ojalada.
- d. Manchega.

40.- Según el censo anual de ganado elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en mayo de 2015, ¿dónde encontramos un mayor número de animales de ganado bovino?

- a. En la provincia de Cáceres.
- b. En la provincia de Badajoz.
- c. En las dos provincias hay un número parejo.
- d. En Extremadura hay un número insignificante de animales de esta especie.

41.- ¿Qué número mínimo de colmenas tiene que reunir una explotación apícola para que se considere profesional?

- a. 50.
- b. 100.
- c. 150.
- d. 500.

42.- Según el art. 6.4 del R.D. 1980/1998, las marcas auriculares en los animales de la especie bovina se colocarán, como regla general:


- a. En todo caso, dentro del plazo de treinta días desde el nacimiento del animal.
- b. Dentro del plazo de veinte días a partir del nacimiento del animal y, en cualquier caso, antes de que el animal abandone la explotación en la que ha nacido.
- c. Dentro del plazo de siete días a partir del nacimiento del animal y, en cualquier caso, antes de que el animal abandone la explotación en la que ha nacido.
- d. Dentro del plazo de quince días a partir del nacimiento del animal.

43.- Los sistemas agrícolas de producción extensiva suponen :

- a. Una explotación racional, moderada y sostenida.
- b. Una explotación de alta productividad.
- c. Una combinación de medios ganaderos y no agrícolas.
- d. Una combinación de medios agrícolas y no ganaderos.


44.- En una ganadería de lidia, el número máximo recomendable de vacas por semental adulto es de:

- a. 10.
- b. 5.
- c. 35.
- d. 70.



- 45.- El modelo de máxima intensificación reproductiva en ganado ovino persigue:
- Un parto cada 6 meses.
 - Cinco partos cada 3 años.
 - Tres partos cada 2 años.
 - Partos cada 150 días.
- 46.- La raza de vacuno extremeña que se incluye en el programa de ayudas destinadas al fomento de razas autóctonas españolas es:
- La limusina.
 - La verata.
 - La retinta.
 - La blanca cacereña.
- 47.- La carga ganadera máxima admisible determinada por la superficie arbolada cubierta del recinto SIGPAC para los animales que dan origen a productos del cerdo ibérico con designación «de bellota», estará entre:
- 0,25 y 1,25 animales por ha.
 - 1,50 y 2,50 animales por ha.
 - 2,50 y 3,50 animales por ha.
 - 3,50 y 10,50 animales por ha.
- 48.- ¿Con qué intensidad del pastoreo se consigue una mayor diversidad vegetal?
- Pastoreo intenso.
 - Infrapastoreo.
 - Sobrepastoreo.
 - El pastoreo no afecta a la diversidad vegetal.
- 49.- De los siguientes compartimientos funcionales de la cabra, ¿cuál se considera el estómago verdadero?
- Rumen.
 - Retículo.
 - Librillo.
 - Abomaso.
- 50.- Tradicionalmente, el cereal más utilizado en alimentación equina es:
- El maíz.
 - El trigo.
 - La cebada.
 - La avena.
- 51.- Según el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, los datos sobre los censos de las explotaciones ganaderas se comunicarán a la autoridad competente al menos:
- Una vez cada dos años.
 - Una vez cada cinco años.
 - Una vez al año.
 - No deben comunicarse estos datos.

- 52.- Con respecto a la dehesa, señale la respuesta correcta:
- Los pastos en las dehesas están formados por pocas especies gramíneas y leguminosas.
 - El trébol subterráneo es incompatible con la dehesa.
 - El sistema de aprovechamiento no puede ser el pastoreo.
 - El suelo de la dehesa es el factor más limitante de la producción vegetal.
- 53.- ¿Cuál de los siguientes tipos de mieles es menos común en el mercado español?
- Azahar.
 - Romero.
 - Eucalipto.
 - Pino.
- 54.- Respecto a la duración del día, si cuando disminuye, la actividad sexual de la oveja es máxima y cuando aumenta es mínima, hablamos de:
- Ciclo estral.
 - Prolificidad.
 - Anoestro de lactación.
 - Anoestro estacionario.
- 55.- ¿Qué dispositivo es el encargado de producir cambios cíclicos de presión en un equipo de ordeño?
- Pezoneras.
 - Pulsador.
 - Vacuómetro.
 - Grifo de vacío.
- 56.- En relación con los alojamientos de verracos en la producción porcina intensiva:
- Deben tener suelos con slats.
 - Debe evitarse la socialización de los verracos.
 - Las cuadras deben tener unas dimensiones de 1,25 x 1,05 m.
 - Deben ser individuales.
- 57.- Según el Programa de Mejora de la Raza Bovina de Lidia, ¿qué parámetro principal se mide para las valoraciones genéticas?
- Rusticidad.
 - Movilidad.
 - Temperamento.
 - Adaptabilidad.
- 58.- Los animales de las especies ovina y caprina nacidos en España después del 9 de julio de 2005 serán identificados, obligatoriamente, mediante una marca auricular y un identificador electrónico, cuando:
- Se destinen a sacrificio antes de los 12 meses de edad dentro del territorio nacional.
 - Se mantengan en la explotación más allá de la edad de 12 meses.
 - Se encuentren en parques zoológicos, y sean trasladados entre ellos, siempre y cuando se identifique individualmente y se puede garantizar su trazabilidad.
 - Por motivos fisiológicos o morfológicos tengan dificultades para identificarse.



59.- Generalmente, ¿con qué edad se sacrifica el ganado equino dedicado a carne, procedente de cebadero?

- a. Con seis meses.
- b. Con un año.
- c. Con dos años.
- d. Con veinte meses.

60.- El principal uso de la cabra retinta es:

- a. La producción de leche.
- b. La producción de carne.
- c. La producción de queso.
- d. La producción de pieles y estiércol.

61.- Un encaste se crea a partir de un aislamiento reproductivo de individuos de una determinada raza, sin introducción de material genético distinto, al menos por un mínimo de:

- a. 3 generaciones.
- b. 5 generaciones.
- c. 10 generaciones.
- d. 15 generaciones.

62.- Si describimos la cola de un bovino de la siguiente manera: "*de nacimiento horizontal, fina ligeramente en arco y terminado en mechón de color blanco*", ¿a cuál de las siguientes razas corresponde?

- a. Blanca cacereña.
- b. Retinta.
- c. Asturiana de los valles.
- d. Limusina.

63.- A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 4/2014, los jamones y paletas denominados "de bellota ibérico", se identificarán con un precinto inviolable de color:

- a. Negro.
- b. Rojo.
- c. Verde.
- d. Blanco.

64.- Las vías pecuarias son bienes:

- a. De dominio privado.
- b. Embargables.
- c. De dominio público.
- d. Alienables.

65.- El ciclo estral de la oveja tiene una duración aproximada de:

- a. 48 horas.
- b. 36 horas.
- c. 17 días.
- d. 25 días.



- 66.- Una de las características de la dehesa es:
- Que sufre un clima Mediterráneo de subhúmedo a semiárido, predominando el subhúmedo.
 - Que el suelo se caracteriza por su pobreza, acidez y escasa profundidad.
 - Que está formada por animales de las distintas especies y razas explotadas en intensivo.
 - Que es un sistema estático.
- 67.- Dentro de las necesidades nutritivas del ganado vacuno, ¿cuál de las siguientes consideraciones es correcta?:
- Las necesidades de sostenimiento son indiferentes al sexo del animal.
 - Las necesidades de sostenimiento varían con el peso del animal.
 - Las necesidades de gestación son mayores durante el primer tercio de este periodo.
 - Las necesidades de gestación son menores durante el último tercio de este periodo.
- 68.- ¿Qué es un majadal?
- Un lugar con pastos de gran calidad y mucha producción.
 - Un tipo de instalación fija utilizada para recoger al ganado.
 - Un sistema de alimentación utilizado en ganado vacuno.
 - Un sistema de pastoreo.
- 69.- Según el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, el material genético que se conservará en los bancos de germoplasma:
- Provendrá de ejemplares inscritos en el libro genealógico de su raza.
 - No se necesita para su obtención el consentimiento del propietario.
 - Se conservará únicamente el ADN de los ejemplares seleccionados.
 - Estará formado por material genético con fines comerciales.
- 70.- ¿Cuándo un animal se considera de raza pura?
- Cuando sus padres son de raza pura.
 - Cuando un progenitor es de raza pura.
 - Cuando sus padres y sus abuelos están inscritos o registrados en el libro genealógico de la misma raza.
 - Cuando sus padres y sus abuelos son de raza pura.

Preguntas adicionales

- 1.- En un esquema de selección, para conseguir el progreso genético de los animales de razas puras, son indispensables:
- Los sistemas de selección de razas genéticamente compatibles.
 - Los cruzamientos entre individuos compatibles.
 - Los sistemas de cruzamientos.
 - Los métodos de control de rendimientos y de evaluación genética.
- 2.- Una característica del sistema digestivo del ganado equino es:
- Que digieren la fibra muy rápidamente.
 - Que necesitan comer muchas veces en pocas cantidades.
 - Que no digieren la celulosa.
 - Que tienen un estómago muy grande.



- 3.- Según el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, ¿cuál es el plazo máximo que tiene un titular de explotación ganadera para comunicar los cambios en los datos consignados en el registro a la autoridad competente?
- Cuatro meses.
 - Dos meses.
 - Un mes desde que se produzcan.
 - No hay plazo máximo
- 4.- Respecto al parto en los animales, señale la correcta:
- Hay cuatro fases: preparatoria, inhibitoria de hormonas, de expulsión del feto y de expulsión de la placenta.
 - En las hembras politocas, la placenta se expulsa al final.
 - El parto comienza con las contracciones, y una vez que cesan, se dilata el cérvix progresivamente.
 - En las hembras monotocas, las contracciones comienzan por el cuello cervical para expulsar el primer feto que se encuentra más cerca del cérvix.
- 5.- El tiempo mínimo del proceso de elaboración para la caña de lomo ibérico será de:
- Un año.
 - Un mes.
 - Una semana.
 - 70 días.
- 6.- En la Comunidad Autónoma de Extremadura, en una superficie sometida a majadeo, ¿cuál de las siguientes especies sería difícil encontrar?
- Trifolium subterraneum*.
 - Medicago arborea*.
 - Ornithopus compressus*.
 - Poa bulbosa*.
- 7.- El conjunto de microbios que recibe el nombre de "flora microbiana" se encuentra en:
- El intestino delgado.
 - El esófago.
 - La panza.
 - En el bonete.
- 8.- En la dehesa, la presencia de arbolado produce efectos sobre el pastizal. Señale la opción correcta:
- Aumenta la superficie de pastizal.
 - Disminuye la velocidad del viento.
 - Disminuye la diversidad de las especies pascícolas.
 - Disminuye el periodo vegetativo de las especies pratenses.
- 9.- La mejor forma de estimular en el ordeño a una vaca es:
- Proporcionándoles elevada cantidad de concentrado.
 - Con presencia de otras vacas.
 - Con la limpieza y el masaje de las ubres.
 - Atando al animal.

- 10.- ¿Cuál es la explotación tipo de ganado equino de raza Española?
- a. Explotación mixta carne-trabajo.
 - b. Explotación mixta carne-ocio.
 - c. Explotación de ocio.
 - d. Explotación para el trabajo.

