

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA, ESPECIALIDAD CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA, EN LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD.**

**Ejercicio. Fase de Oposición. TURNO LIBRE**

**EN CÁCERES, A 30 DE JUNIO DE 2018.**

**1.- En la reconstrucción de mama con colgajo miócutáneo del dorsal ancho , la arteria responsable de la vascularización es:**

- a) tóraco abdominal.
- b) torácica posterior.
- c) tóraco dorsal.
- d) tóraco acromial.

**2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a los colgajos libres es cierta?**

- a) El colgajo libre anterolateral de muslo, por definición, está basado en la rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral.
- b) En el colgajo SIEAP, la arteria epigástrica inferior superficial está ausente en aproximadamente el 5% de los casos.
- c) La isla cutánea del colgajo libre osteoseptocutáneo de peroné, no es un adecuado indicador de la vascularización del hueso peroné.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

**3.- Según Mathes y Nahai, cuál de los siguientes es un colgajo fasciocutáneo tipo C:**

- a) colgajo interóseo posterior.
- b) colgajo lateral del brazo.
- c) colgajo escapular.
- d) colgajo deltopectoral.

**4.-El nevus de Ota:**

- a) Se localiza en la zona de la cara inervada por los ramos oftálmico y maxilar del trigémino con afectación de la esclerótica.
- b) Se localiza y abarca la zona de la cara inervada por los ramos oftálmico y mandibular del trigémino.
- c) A veces se asocia a alteraciones neurológicas y puede tener carácter hereditario.
- d) b y c son correctas.

**5.-Según la clasificación de los ganglios del cuello por niveles establecida por el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, ¿cuál es el espacio cuyos límites son: desde el hueso hioides hasta la escotadura supraesternal y entre los bordes mediales de las vainas carótidas?**

- a) IV
- b) VA
- c) VB
- d) VI

**6.- ¿Dónde se localiza la fascia de Colles?**

- a) Cuello.
- b) Muñeca.
- c) Región inguinoperineal.
- d) Pie.

**7.- ¿Cual de las siguientes anomalías no suele darse en el Síndrome de Riley?**

- a) Macrocefalia.
- b) Pseudoedema papilar.
- c) Hemangiomas.
- d) Coloboma palpebral.

**8.-¿Cuál de los siguientes músculos no está inervado por el nervio facial?**

- a) corrugator.
- b) procerus.
- c) digástrico anterior.
- d) digástrico posterior.

**9.-¿Por la cara profunda de qué capa anatómica transcurre la arteria dorsal del pene?**

- a) Túnica albugínea.
- b) Fascia de Buck.
- c) Fascia dartos.
- d) Tunica vaginalis.

**10.- ¿En cual de las siguientes entidades hay un trastorno del colágeno?:**

- a) Síndrome de Marfan.
- b) Cutis laxa.
- c) Progeria.
- d) Osteogénesis imperfecta.

**11.- El hemangiopericitoma:**

- a) Es considerado un tumor agresivo o incluso maligno.
- b) Las metástasis son poco frecuentes.
- c) Cuando se ausculta por encima de la superficie tumoral puede oírse un soplo vascular.
- d) Todas son correctas.

**12.- El pie de Morand:**

- a) Es consecuencia de una artropatía neuropática.
- b) Es consecuencia de congelaciones graves.
- c) Es un pie polidactílico que suele tener ocho dedos.
- d) Se produce casi siempre en pacientes diabéticos insulín dependientes.

**13.- Señale un criterio mayor en el diagnóstico del Síndrome de Gorling (Síndrome de carcinoma de células basales nevoideas) :**

- a) Costillas bífidas.
- b) Macrocefalia.
- c) Hendidura palatina.
- d) Hipertelorismo.

**14.-¿Cuál de las siguientes características se presenta en el Síndrome de Scheie (Mucopolisacaridosis)?**

- a) Escasa afectación de la inteligencia.
- b) Boca estrecha con labios finos.
- c) Alopecia generalizada.
- d) Proptosis ocular.

**15.- Durante la reanimación del quemado, el índice más seguro de que la reposición líquida está siendo adecuada, viene dado por**

- a) tensión arterial (TA).
- b) frecuencia cardíaca.
- c) diuresis horaria.
- d) presión venosa central (PVC).

**16.-¿Cómo se calcula el Índice de Masa Corporal (IMC)?**

- a) Dividiendo el Índice Graso entre el Índice óseo.
- b) Dividiendo el peso corporal (en Kg) entre el Índice Óseo.
- c) Dividiendo la superficie corporal (en m<sup>2</sup>) entre la talla.
- d) Dividiendo el peso corporal (en kg) entre el cuadrado de la talla (en metros).

**17.- En el análisis estadístico de un estudio clínico, las sentencias siguientes son correctas, excepto:**

- a) El análisis de la regresión se usa para ver cómo un conjunto de datos se relaciona con otro.
- b) El test Chi-cuadrado es una medida de la diferencia entre las frecuencias observadas y las esperadas.
- c) El modo es el punto que tiene la mitad de los valores por encima y la mitad por debajo.
- d) La correlación mide la asociación entre variables.

**18.- Señale los tumores que muestran diferenciación ecrina:**

- a) Siringoma y siringoma condroide.
- b) Hidrocistoma y siringocistoadenoma papilífero.
- c) A y B son correctas.
- d) A y B son incorrectas.

**19.- En la reanimación de pacientes con quemaduras, indique a qué fórmula recurriría si desea aplicar una solución salina hipertónica:**

- a) Brooke.
- b) Haifa.
- c) Slater.
- d) Warden.

**20.- El Dr. Swyer describió por primera vez en 1955 el síndrome que lleva su nombre, conociéndose como disgenesia gonadal completa. Señale a qué corresponde:**

- a) 46XY.
- b) 46XX.
- c) 45X.
- d) Mosaico 46XX/45X.

**21.- Björnstad observó la asociación de cabello ensortijado (pili torti) que se rompe con facilidad con cual de las siguientes anomalías:**

- a) Sordera.
- b) Polidactilia preaxial.
- c) Fisura palatina.
- d) Alopecia cutis.

**22.- Ante secreción purulenta por la incisión de abordaje tras un aumento con prótesis mamaria, qué decisión será más adecuada:**

- a) Se ingresará la paciente para instaurar tratamiento antibiótico intravenoso
- b) Se instaurará un sistema de lavado continuo.
- c) Se introducirá un drenaje.
- d) Se extraerá la prótesis.

**23.- La piel central del hemiabdomen inferior está fundamentalmente vascularizada por:**

- a) Arteria epigástrica inferior superficial.
- b) Arteria epigástrica inferior profunda.
- c) Arteria epigástrica superior.
- d) Arteria ilíaca circunfleja superficial.

**24.- ¿Cuál de las siguientes sentencias referidas a las suturas es falsa?:**

- a) El Ácido poligláctico ((Vicryl®) es una sutura sintética multifilamento, que pierde su fuerza tensil tras 4-5 semanas y se reabsorbe a los 3 meses.
- b) La Polidioxanona (PDS®) es una sutura sintética monofilamento, que pierde su fuerza tensil tras 3 semanas y se absorbe a los 2 meses.
- c) El Polipropileno (Prolene®) es un polímero del propylene, monofilamento no absorbible, que puede usarse para reparar fascia, tendón, músculo y vasos.
- d) Las suturas de catgut, derivadas del intestino de cordero, pierden su fuerza tensil tras 7-10 días y son absorbidas a los 2 meses.

**25.- La maniobra de Eklund:**

- a) Es muy común para desepitelizar fragmentos cutáneos de mama durante la mamoplastia.
- b) Se utiliza durante la realización de mamografías en mamas portadoras de implantes.
- c) Se utiliza en la reducción de las fracturas del cuello de los metacarpianos.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

**26.- En un Síndrome de Cowden, el cirujano plástico será requerido probablemente para:**

- a) Corregir el hipospadias.
- b) Tratamiento quirúrgico de una fisura palatina.
- c) Realizar el tratamiento de un pulgar duplicado.
- d) Prevenir y/o reconstruir un cáncer de mama.

**27.-Cual de las siguientes estructuras, se afecta con mayor frecuencia en la enfermedad de Dupuytren:**

- a) Ligamento de Colles.
- b) Ligamento de Cleland.
- c) Ligamento de Landsmeer.
- d) Ligamento de Grayson.

**28.- Werner describió en su tesis doctoral la enfermedad que lleva su nombre y en la que es poco probable que se presente:**

- a) Cabello escaso y gris.
- b) Macroductilia.
- c) Nariz picuda.
- c) Diabetes.

**29.-La plastia Dufourmentel consiste en:**

- a) Zplastias múltiples
- b) Plastias de rotación de mejilla.
- c) Plastia de avance.
- d) Plastia romboidal de transposición.

**30.- El colgajo de la ingle (groin flap) está habitualmente basado en:**

- a) Arteria ilíaca circunfleja profunda.
- b) Arteria ilíaca circunfleja lateral.
- c) Arteria epigástrica inferior superficial.
- d) Arteria femoral circunfleja superficial.

**31.- Respecto a la anestesia local, señale lo incorrecto:**

- a) La dosis máxima de lidocaína es 4 mg/kg.
- b) La dosis máxima de lidocaína + adrenalina (epinefrina) es 7 mg/kg.
- c) La rapidez de la infiltración raramente influye la percepción del dolor por el paciente.
- d) Calentar la solución puede reducir el dolor durante la administración.

**32.- Respecto al carcinoma de células de Merkel:**

- a) Se ha postulado su relación con un poliomavirus.
- b) Es un tumor neuroendocrino frecuentemente doloroso.
- c) Es característico su color amarillento y ulcerado.
- d) Se disemina tardíamente a distancia tanto por vía linfática como hematogena.

**33.- En relación a la anestesia de pacientes quemados, señale la respuesta falsa.**

- a) La hepatitis por halotano en niños es prácticamente desconocida por lo que se considera bastante seguro repetir las anestесias con este compuesto.
- b) Hay que tener precaución cuando se usa Enflurano en quemados epilépticos.
- c) El suxametonio puede producir incrementos sustanciales del potasio sérico.
- d) Los grandes quemados rara vez muestran resistencia a los relajantes musculares no polarizantes.

**34.- Wilbourn estableció una útil clasificación referida a:**

- a) Rizartrosis.
- b) Fracturas distales del radio.
- c) Síndrome de compresión del desfiladero torácico.
- d) Parálisis braquial congénita.

**35.- En la entidad conocida por el término "Incontinentia Pigmenti" introducido por Bloch, es cierto que:**

- a) Es más frecuente en mujeres
- b) En gran parte de los casos existe basofilia en los primeros años de la vida.
- c) Las lesiones cutáneas empiezan a manifestarse en la adolescencia.
- d) Es rara la afectación del Sistema Nervioso Central.

**36.- En el síndrome compartimental**

- a) A veces sólo incidiendo la piel es suficiente para evitar la isquemia muscular.
- b) Sólo está indicada si no hay pulso.
- c) El único tratamiento fiable es la fasciotomía.
- d) La fasciotomía sólo está indicada si no funciona la oxigenoterapia hiperbárica.

**37.- En una contractura fija en flexión de una articulación interfalángica proximal, ¿cuál es la estructura que más contribuye a la flexión rígida?**

- a) El ligamento colateral.
- b) La parte proximal contraída del plato volar.
- c) El ligamento colateral accesorio.
- d) El tendón flexor.



**38.- Referente a los compartimentos de los tendones extensores en la muñeca:**

- a) El extensor indicis proprius comparte compartimento con el extensor digitorum communis.
- b) El primer compartimento contiene el extensor carpi radialis longus y el extensor carpi radialis brevis.
- c) El nervio interosseo posterior transcurre en el tercer compartimento.
- d) El extensor carpi ulnaris y el extensor digiti minimi comparten el quinto compartimento.

**39.- El Índice de Nottingham es un útil factor pronóstico en el cáncer de mama. ¿Qué relaciona?:**

- a) Tamaño de la lesión, número de ganglios afectados y grado del tumor.
- b) Porcentaje de receptores positivos de estrógenos, progesterona y HR2.
- c) Número de mitosis, densidad de afectación microvascular y angiogénesis.
- d) Porcentaje de positividad de receptores de estrógenos, progesterona y p53.

**40.- La mancha en vino de Oporto o nevus flammeus:**

- a) Es una malformación intradérmica de aparición en el primer año de vida.
- b) Está presente aproximadamente en el 0,3 al 0,5 % de los recién nacidos.
- c) Regresa espontáneamente antes del sexto año de vida en un 80% de los casos.
- d) Todas son correctas.

**41.- La transferencia de tejido graso autólogo es una técnica relativamente novedosa, que sin embargo ya fue realizada y publicada en el siglo XIX. ¿Por qué autor?:**

- a) Parry.
- b) Bruns.
- c) Neuber.
- d) Reverdin.

**42.- ¿Qué característica facial no suele darse en la hipercalcemia infantil?**

- a) Labios gruesos
- b) Epicantos
- c) Prognatismo mandibular
- d) Nariz pequeña.

**43.- Ante un paciente con melanoma metastático de tumor primario desconocido el primer paso a seguir es:**

- a) tratamiento oncológico inmunoterápico
- b) pruebas radiológicas específicas (TAC, RMN)
- c) extirpación de todas las lesiones pigmentadas
- d) exploración cuidadosa de la piel en busca de una posible lesión primaria

**44.- La ferulización de la mano en posición funcional incluye:**

- a) Articulaciones metacarpofalángicas flexionadas a aproximadamente 60°.
- b) Articulaciones interfalángicas proximales flexionadas a aproximadamente 90°.
- c) Articulaciones interfalángicas proximales flexionadas a aproximadamente 60°.
- d) Articulaciones interfalángicas distales flexionadas a aproximadamente 60°.

**45.- El túnel del carpo:**

- a) Contiene el flexor carpi radialis.
- b) Contiene la arteria cubital.
- c) Contiene el flexor carpi ulnaris.
- d) Está formado por las filas carpianas proximal y distal y el retináculo flexor.

**46.- ¿Cuál de los siguientes tumores de parótida es hipercaptante en una gammagrafía con tecnecio-99:**

- a) Tumor de Warthin.
- b) Tumor mixto.
- c) Carcinoma mucoepidermoide.
- d) Adenocarcinoma.

**47.- ¿Cuál de los siguientes síndromes no está considerado actualmente en el grupo de los que predisponen al cáncer de mama?**

- a) Ataxia-telangiectasia
- b) Síndrome de Li-Fraumeni
- c) Síndrome de Nichtenberg
- d) Síndrome de Lynch

**48.- ¿Qué técnica de corrección de epispadias supuso una gran mejoría al hacer hincapié en lograr un buen alargamiento y enderezamiento del pene?:**

- a) Snodgrass.
- b) Cantwell-Ransley.
- c) Duplay.
- d) Byars.

**49.- En la Pleonosteosis de Leri es frecuente:**

- a) Palmas y plantas con piel muy fina.
- b) Pulgares anchos.
- c) Hendiduras palpebrales con oblicuidad antimongoloide.
- d) Senos paranasales obliterados.

**50.- Respecto a la cirugía del labio leporino:**

- a) El borde libre del orbicular debe suturarse a las fibras ipsilaterales.
- b) Es esencial conseguir una altura simétrica a la del lado opuesto.
- c) En el tratamiento primario no se incluye la intervención sobre la narina.
- d) El colgajo propuesto por Millard consiste en una Zplastia múltiple.

**51.- En la corrección de la deformidad en cuello de cisne es esencial:**

- a) Reparar el mecanismo extensor en el dorso de la articulación interfalángica proximal.
- b) Conseguir una ligera flexión o posición neutra en la articulación interfalángica proximal.
- c) Seccionar parcialmente el mecanismo extensor distal a la articulación interfalángica proximal.
- d) Liberar la placa volar.

**52.- Señala la sentencia incorrecta referente a los músculos lumbricales:**

- a) Flexionan las articulaciones metacarpofalángicas.
- b) Extienden las articulaciones interfalángicas proximales.
- c) Son abductores de los dedos.
- d) Su parálisis produce una deformidad en garra.

**53.- Con respecto a la ptosis palpebral producida por Miastenia Gravis, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) Suele existir afectación pupilar.
- b) Los síntomas mejoran o desaparecen con el descanso y aumentan al final del día.
- c) La ptosis palpebral puede ser el primer signo de la enfermedad.
- d) Los síntomas revierten con la inyección de prostigmina (neostigmina).

**54.- Respecto a la liposucción, señale la respuesta correcta:**

- a) Fisher describió una modificación de la posición en quirófano con el paciente colocado en la camilla en posición vertical a fin de poder ver los acúmulos grasos en su posición habitual.
- b) Gasparotti describió una variación utilizando cánulas gruesas (diámetros superiores a 6 mm) muy cerca de la piel para provocar fibrosis y adherencia del colgajo cutáneo.
- c) Está contraindicado utilizar en la misma área quirúrgica liposucción láser y liposucción convencional.
- d) En la liposucción láser la energía se aplica de forma interna mediante finas sondas bajo la piel. No es posible aplicar dicha energía de forma efectiva y segura de forma externa mediante barrido de luz.

**55.- El término blefaroplastia fue utilizado por primera vez en 1818 para describir procedimientos reconstructivos tras extirpaciones oncológicas palpebrales. ¿A quien es atribuido?:**

- a) Heister.
- b) Dieffenbach.
- c) Von Graefe.
- d) McGregor.

**56.- En la telangiectasia hemorrágica de Osler:**

- a) Es rara la afectación de mucosas.
- b) Es rara la afectación visceral.
- c) Las telangiectasias suelen hacerse aparentes al final de la infancia.
- d) La observación de mejoría durante los embarazos fue el inicio de la terapia hormonal.

**57.-El carcinoma intraepitelial “in situ” de la mucosa del pene, se conoce por:**

- a) Eritroplasia de Queirat.
- b) Enfermedad de Bowen.
- c) Enfermedad de Lewandosky-Lutz.
- d) Leucoplasia de Fordyce.

**58.- ¿Cuál de las siguientes infecciones no causa mononeuropatías?**

- a) Lepra.
- b) Herpes zoster.
- c) Bilharziosis (esquistosomiasis).
- d) Difteria.

**59.- En el reimplante de un pulgar avulsionado:**

- a) Hay que evitar acortar el hueso.
- b) Hay que restaurar la función del flexor largo del pulgar.
- c) Las arterias son más resistentes al daño de la íntima que las venas.
- d) Frecuentemente es necesario un injerto venoso desde la arteria radial en la tabaquera anatómica.

**60.- ¿Cuál de las siguientes no es una causa de pseudoptosis palpebral?**

- a) Síndrome oculofaríngeo
- b) Enoftalmos
- c) Hipotropía
- d) Orbitopatía tiroidea

**61.- ¿Cuál de las siguientes consideraciones sobre el Nevus de Spitz es falsa:**

- a) Es más frecuente en adultos, aunque hay casos descritos en los primeros años de la vida.
- b) Debe su nombre a Sophie Spitz, la patóloga que lo describió en 1948.
- c) En niños se localizan con más frecuencia en cara, cabeza y cuello y en adultos se localizan con mayor frecuencia en las extremidades.
- d) Generalmente son lesiones asintomáticas.

**62.- ¿Cuál de los siguientes síndromes no suele incluir una microtía?:**

- a) Goldenhar.
- b) Crouzon.
- c) Treacher-Collins.
- d) Microsomía hemifacial.

**63.-¿Cuál de las siguientes sustancias químicas producen quemaduras que son típicamente muy dolorosas con escaras necróticas y profundas de color amarillento que brilla en la oscuridad?**

- a) Fósforo blanco
- b) Fenol
- c) Ácido fluorhídrico
- d) Ácido clorhídrico

**64.- En el cálculo de la superficie corporal quemada, señalar la premisa falsa:**

- a) En las grandes extensiones es preferible calcular el área indemne.
- b) Cada extremidad inferior supone un 18%.
- c) La regla de los 9 de Wallace no es aplicable a los niños.
- d) La mano del explorador supone un 1%.

**65.- Una indicación absoluta para la cirugía en la enfermedad de Dupuytren es:**

- a) Bridas palpables.
- b) Contractura de la articulación metacarpofalángica.
- c) Contractura de la articulación interfalángica proximal.
- d) Ninguna de las anteriores.

**66.- La lesión de Stener (pulgar del esquiador) ocurre cuando:**

- a) El ligamento colateral cubital queda atrapado por el abductor pollicis brevis.
- b) El ligamento colateral cubital queda atrapado por el extensor pollicis brevis.
- c) El ligamento colateral cubital queda atrapado por la aponeurosis del aductor pollicis.
- d) El ligamento colateral cubital queda atrapado por el abductor pollicis longus.

**67.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el carcinoma verrugoso es falsa?**

- a) Se le ha relacionado con los Papilomavirus Humanos 1, 2, 6, 11, 16 y 18
- b) La variedad conocida como condilomatosis gigante de Buscke-Lowenstein consiste en proliferaciones vegetantes y papilomatosas parecidas a los condilomas acuminados aunque a diferencia de estos no suele afectar a genitales.
- c) Es un carcinoma espinocelular de baja malignidad y poco invasor
- d) La forma oral se denominada papilomatosis oral florida.

**68.- ¿Cuál de los siguientes músculos no está innervado por el nervio peroneo profundo?**

- a) Extensor largo de los dedos
- b) Extensor largo del pulgar
- c) Peroneo anterior
- d) Peroneo lateral largo

**69.- Con respecto a la anatomía de los párpados, señale lo correcto:**

- a) La grasa SOOF está situada en el párpado superior.
- b) La grasa ROOF es retroauricular del párpado inferior.
- c) Tanto SOOF como ROOF son acúmulos preseptales.
- d) Todas son correctas.

**70.- Señale lo incorrecto en el Síndrome de Peutz-Jeghers:**

- a) Las manchas pigmentadas aparecen desde el primer año de la vida.
- b) Las manchas pigmentadas tienden a desaparecer en el adulto.
- c) Más de la mitad desarrollarán un cáncer a los 70 años.
- d) Se debe a la mutación del gen JMHP1 heredada de uno de los padres.

**71.-Una camptodactilia :**

- a) Es la deformidad en flexión de la interfalángica proximal del 5º dedo.
- b) Es la deformidad en flexión de la interfalángica distal del 5º dedo.
- c) Es la deformidad en extensión de la interfalángica proximal del 5º dedo.
- d) Es la deformidad en extensión de la interfalángica distal del 5º dedo.

**72.- ¿Cuál de los siguientes nervios proporciona la principal inervación al complejo areolar-pepón?**

- a) 2º nervio intercostal lateral
- b) 3º nervio intercostal lateral
- c) 4º nervio intercostal lateral
- d) 5º nervio intercostal lateral

**73.-¿Cuál de las siguientes sentencias es incorrecta respecto a la técnica dual-plano de aumento mamario?**

- a) Hay menos riesgo de visibilidad del implante.
- b) Hay menos riesgo de palpabilidad del implante y transición brusca en el polo superior.
- c) Disminuye la deformidad double-bubble.
- d) Disminuye la formación capsular.

**74.-Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a los agujeros de la base del cráneo por donde salen los pares craneales**

- a) Nervio Espinal: agujero rasgado posterior.
- b) Nervio Motor Ocular Común: hendidura esfenoidal.
- c) Nervio Hipogloso: agujero oval.
- d) Nervio Facial: agujero estilomastoideo.

**75.- La Púrpura fulminans es un raro síndrome que produce trombosis intravascular y necrosis cutánea. Ocurre normalmente en niños. La bacteria más comúnmente asociada a la Púrpura fulminans es:**

- a) Streptococcus Beta-hemolíticos grupo A.
- b) Staphylococcus aureus.
- c) Neisseria meningitidis.
- d) Pseudomona aeruginosa.



**76.- La angiosarcomatosis de Kaposi:**

- a) Es más frecuente en mujeres.
- b) Evoluciona rápidamente hacia el éxito.
- c) No afecta hueso.
- d) Algunas lesiones se resuelven espontáneamente dejando cicatrices atróficas y pigmentadas.

**77.-¿Dónde se encuentran situadas las glándulas de Blandin o de Nuhn?**

- a) Lengua
- b) Cuello
- c) Axilas
- d) Planta del pie

**78.- La malformación del pabellón auricular consistente en el desarrollo de una tercera crura en el polo superior, acompañado de hélix aplanado y de fosa escafoidea deformada, se conoce como:**

- a) Oreja de Stahl.
- b) Oreja de Spock.
- c) Lop ear.
- d) A y B son correctas.

**79.- En una reconstrucción mamaria mediante un colgajo TRAM libre a una mujer fumadora durante muchos años, los riesgos de desarrollar las siguientes complicaciones están aumentados excepto:**

- a) Necrosis del colgajo abdominal.
- b) Necrosis grasa.
- c) Hernia.
- d) Infección del tracto respiratorio inferior.

**80.- Con respecto a la reconstrucción mamaria autóloga, ¿Cuál de las siguientes sentencias es incorrecta?**

- a) El pezón debe ser siempre resecado en casos de cáncer mamario invasivo situado a menos de 2,5 cm de la areola.
- b) La reconstrucción primaria es usualmente mejor que la secundaria.
- c) La mastectomía conservadora de piel presenta más recidivas locales.
- d) El Colgajo de dorsal ancho no es el colgajo ideal para grandes reconstrucciones.

**81.- Cuál de los siguientes huesos no es uno de los que conforman la órbita:**

- a) Hueso temporal.
- b) Cigomático.
- c) Frontal.
- d) Etmoides.

**82.- Las perforantes septocutáneas que nutren el colgajo de perforantes del tensor de la fascia lata, descrito por Hubner en 2009, se sitúan entre el tensor de la fascia lata y qué otro músculo:**

- a) Recto anterior.
- b) Vasto externo.
- c) Biceps femoral.
- d) Glúteo medio.

**83.- Señale lo incorrecto respecto al cierre de defectos abdominales mediante la técnica conocida como “separación por componentes”:**

- a) Se realiza una disección entre los músculos oblicuo externo e interno.
- b) Fue descrita por Martínez et al.
- c) Se realiza una fasciotomía sobre la aponeurosis del músculo oblicuo externo.
- d) Puede cerrar defectos de 20 cm en la línea media.

**84.- ¿Quién contribuye de manera predominante en la producción de saliva?**

- a) Parótidas.
- b) Submaxilares.
- c) Sublinguales.
- d) Glándulas salivares menores.

**85.- La articulación más afectada en la mano reumática es:**

- a) Interfalángica proximal (IFP).
- b) Metacarpofalángica (MCF).
- c) Trapeciometacarpiana (TMC).
- d) Interfalángica distal (IFD).

**86.- Con relación a la reconstrucción de pene, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- a) El colgajo libre cubital de antebrazo tiene ventajas significativas sobre el colgajo radial de antebrazo.
- b) La reconstrucción para tener función sexual y lograr el orgasmo no es posible.
- c) La internación peneana se logra exclusivamente a partir del nervio genitofemoral.
- d) La reconstrucción ósea vascularizada con un colgajo libre de peroné es una falacia.

**87.- ¿Cuál de los siguientes efectos sistémicos se produce en un gran quemado?**

- a) Aumento de la precarga cardiaca.
- b) Disminución de la resistencia vascular sistémica.
- c) Aumento de la resistencia vascular pulmonar.
- d) Hiperproteinemia.

**88.- ¿Con cuál de las siguientes lesiones vasculares es más probable que ocurra el Fenómeno de Kasabach-Merritt?**

- a) Angiosarcoma.
- b) Hemangioma.
- c) Hemangiopericitoma.
- d) Hemangioendotelioma Kaposiforme.

**89.- El trago deriva de cuál de los siguientes precursores embrionarios:**

- a) El primer arco branquial.
- b) El segundo arco branquial.
- c) El arco hioideo.
- d) La primera hendidura branquial.

**90.- El angiosarcoma surgido sobre el edema de la extremidad superior homolateral consecutivo a una mastectomía (a veces años después) se conoce cómo:**

- a) Síndrome de Melkerson-Rosenthal.
- b) Enfermedad de Milroy.
- c) Síndrome de Sipple.
- d) Ninguno de los anteriores.

**91.- ¿Qué nervio proporciona sensibilidad táctil a la nasofaringe, paladar blando y tercio posterior de la lengua?**

- a) V
- b) VII
- c) IX
- d) X

**92.- Respecto a los tipos de melanoma, señale entre las siguientes la respuesta falsa**

- a) El melanoma de extensión superficial supone el 70% de todos los melanomas.
- b) El melanoma nodular tiene un crecimiento lento, ya que no tiene crecimiento vertical.
- c) El léntigo melanoma maligno se origina a partir de una forma de melanoma in situ denominada melanosis de Hutchinson.
- d) El melanoma lentiginoso acral se localiza en palmas, plantas, zona periungueal y lecho de uñas.

**93.- En las fasciotomías del pie es cierto que:**

- a) El abordaje lateral es el usado con más frecuencia.
- b) El abordaje dorsal se realiza a través de una única incisión.
- c) El abordaje medial requiere dos incisiones para acceder a los tres compartimentos que existen en la planta del pie.
- d) Ninguno de los anteriores es cierto.

**94.- Los requerimientos calóricos para los quemados adultos son:**

- a) Calculados basándose en la fórmula de Cuschieri.
- b) Ajustados idealmente por una relación calorías-nitrógeno de 500:1.
- c) 25 kcal/kg + 40 kcal/%quemadura.
- d) Deben proporcionarse parenteralmente en cuanto sea posible.

**95.- En la técnica de reconstrucción de la pared abdominal de separación de componentes, la disección quirúrgica profunda a la fascia oblicua interna justo lateral a la línea semilunar pueden ocasionar una de las siguientes hernias:**

- a) Spiegel
- b) Bochdalek
- c) Obturatriz
- d) Richter

**96.- El colgajo del músculo tibial anterior suele utilizarse para pequeños defectos en el tercio medio de la pierna. Está innervado por ramas, que a veces es necesario seccionar, procedentes de qué nervio:**

- a) Tibial anterior
- b) Tibial posterior
- c) Tibial profundo
- d) Peroneo profundo

**97.- El colgajo frontal paramediano es el estándar en la reconstrucción nasal total, ¿Qué arteria es su principal aporte vascular? :**

- a) Supraorbitaria.
- b) Rama frontal de la arteria temporal.
- c) Supratroclear.
- d) Rama frontal de la arteria angular.

**98.-Cuál de los siguientes colgajos puede considerarse una evolución del clásico colgajo deltopectoral descrito por Bakamjian en 1965:**

- A) Imap Flap
- B) TAP Flap
- C) Supraclavicular Flap
- D) ICP Flap

**99.- La corrección definitiva del labio leporino unilateral completo mediante la técnica de Millard básicamente consiste en:**

- a) Una adhesión simple labial
- b) Colgajos cuadrangulares labiales.
- c) Colgajos triangulares labiales
- d) Un colgajo de avance-rotación

**100.- En una extensa cicatrización postquemadura que restringe los movimientos de todas las articulaciones de ambos miembros superiores, ¿cuál debe ser el orden de prioridad de la liberación quirúrgica?**

- a) La mano dominante debe ser tratada primero.
- b) La mano más severamente deformada debe ser tratada primero independientemente de la dominancia.
- c) La mano menos deformada debe ser tratada primero independientemente de la dominancia.
- d) La axila de la mano dominante debe ser tratada primero.

**101.- ¿Cuál de las siguientes es la indicación más clara para una fasciotomía de miembro inferior?**

- a) Quemadura eléctrica de una pierna que afecta al 12 % de la superficie corporal.
- b) Presión compartimental de 15 mmHg.
- c) Presión compartimental de 20 mmHg.
- d) Signo de Homan positivo.

**102.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con relación a la enfermedad de Peyronie es falsa?:**

- a) El dolor es un síntoma que aparece en la fase inflamatoria de la enfermedad y generalmente es de carácter leve y durante la erección.
- b) El pene puede incurvarse hacia su cara dorsal, ventral o lateral.
- c) Se diagnostica por inspección y palpación.
- d) Es más frecuente en orientales.

**103.- ¿Dónde se localizan los cartílagos de Santorini y Wrisberg?**

- a) Cuello
- b) Tórax
- c) Mano
- d) Pie

**104.- El test de Kapandji se utiliza para valorar la:**

- a) Movilidad de la mano y dedos. \*\*\*\*
- b) Sensibilidad de la mano y dedos.
- c) Fuerza de prensión de la mano y dedos.
- d) Dolor de la mano y dedos.

**105.- ¿Qué tipo de microorganismo produce la enfermedad mano-pie-boca?**

- a) Una Rickettsia.
- b) Un Virus Coxsackie.
- c) Un Aspergillus.
- d) Una Clamidia.

**106.- ¿Cuál de las siguientes No es una complicación digestiva secundaria de las quemaduras?**

- a) Íleo paralítico.
- b) Síndrome de malabsorción ileal de stress.
- c) Úlceras gástricas de stress.
- d) Síndrome de la arteria mesentérica superior.

**107.- El Síndrome de Frey:**

- a) Ocurre cuando la inervación parasimpática de las glándulas sudoríparas es reemplaza por la inervación parasimpática de la parótida.
- b) Ocurre aproximadamente en la mitad de los pacientes a los que se les extirpa la glándula submaxilar.
- c) Fue descrito por Lucja Frey en el s. XVIII.
- d) Se le conoce también como síndrome de Baillarger.

**108.- ¿Cuál de los siguientes nervios no proporciona sensibilidad a la oreja?**

- a) Nervio temporal superficial.
- b) Rama auricular del vago.
- c) Nervio occipital menor.
- d) Nervio auriculotemporal.

**109.-¿Cuál de los siguientes anestésicos locales no es del grupo amida?**

- a) Cocaína.
- b) Lidocaína.
- c) Bupivacaína.
- d) Ropivacaína.

**110.- Los patólogos incluyen rutinariamente información sobre el p53 en las piezas con tumores mamarios. Señale la respuesta incorrecta.**

- a) Se expresa en el núcleo de la célula neoplásica.
- b) Se trata de un gen acelerador del crecimiento tumoral.
- c) Se considera que es positiva cuando se detecta en un 10% o más de las células.
- d) Su nombre hace referencia a su masa molecular aparente.

**111.-Los betabloqueantes tienen importantes indicaciones en las alteraciones hemodinámicas de algunos pacientes quemados.Cuál de los siguientes fármacos no es un betabloqueante;**

- a) Alprenolol
- b) Atenolol
- c) Propanolol
- d) Timolol



**112.-El colgajo FMM (Facial Artery MusculoMucosal Flap) publicado por Pribaz en 1992:**

- a) Contiene mucosa, submucosa y una pequeña cantidad de músculo depresor labii inferioris.
- b) Cuando se basa inferiormente para defectos del paladar anterior es conveniente utilizar un bloqueador de la mordida durante 10 días y seccionar luego el pedículo.
- c) Tiene una orientación horizontal desde el triángulo retromolar y a través del surco gingival inferior.
- d) Siempre debe ser posterior a la desembocadura del conducto de Stenon.

**113.- Con respecto al melanoma de mucosas, señale la respuesta incorrecta:**

- a) Tienen un pronóstico muy favorable
- b) Suelen localizarse en la mucosa oral, genital y anal
- c) En general su incidencia es baja
- d) Más de la mitad (55%) de los melanomas de las mucosas se localizan en la cabeza y el cuello

**114.- El porcentaje con que una leucoplasia degenera en cáncer invasivo en los siguientes 12 años es:**

- a) 30%
- b) 50%
- c) 60-100%
- d) Ninguno de los anteriores

**115.- ¿Cuál de las siguientes es la afectación maligna más frecuente debida a inmunosupresores en los receptores de transplantes.**

- a) Cáncer de piel.
- b) Sarcoma de Kaposi.
- c) Carcinoma renal.
- d) Tumoración linfoproliferativa.

**116.- Los siguientes artículos son referentes en Cirugía Plástica. ¿En cuál de ellos no consta el autor correcto?**

- a) Allen: 1994. Deep inferior epigastric perforator flap for breast reconstruction.
- b) Wei: 1989. The anterolateral thigh flap: Variations in vascular pedicle.
- c) Randall:1959. A triangular flap operation for the primary repair of unilateral clefts of the lips.
- d) Evans :1952. Fluid and electrolyte requirements in severe burns.

**117.- La rama descendente de la arteria glútea inferior aporta gran parte de la vascularización del colgajo de perforantes de la a. glútea inferior. A nivel del borde inferior del músculo glúteo mayor suele ir acompañada del nervio femorocutáneo posterior ¿entre qué dos músculos?**

- a) Bíceps femoral y semitendinoso.
- b) Semimembranoso y semitendinoso.
- c) Semimembranoso y tensor de la fascia lata.
- d) Semimembranoso y aductor mayor.

**118.- Cual de los siguientes es el efecto secundario más frecuente de la sulfadiazina argéntica:**

- a) Trombocitopenia.
- b) Leucopenia.
- c) Aumento del TPTA.
- d) Descenso del fibrinógeno.

**119.-.- Señale la afirmación incorrecta:**

- a) La inervación motora de la laringe proviene esencialmente del recurrente que inerva casi todos los músculos laríngeos, pero no, por ejemplo, el cricotiroideo que está inervado por el laríngeo externo.
- b) El trayecto del nervio recurrente derecho es más corto que el del izquierdo.
- c) Tanto el nervio laríngeo superior como el inferior son ramas del vago.
- d) El vago es un nervio mixto que soporta también la mayor parte de la función vasomotora y

secretora de la laringe.

**120.- Señale la respuesta incorrecta referente al dermatofibrosarcoma protuberans**

- a) Su alta mortalidad obliga a un diagnóstico precoz.
- b) Es frecuente su localización en el tórax.
- c) Raramente metastatiza por vía linfática.
- d) Tiene un crecimiento lento y progresivo con una gran capacidad destructiva local.

**121.- Los siguientes factores de riesgo están asociados con la transformación maligna de una leucoplasia excepto:**

- a) Género (más frecuente en mujeres)
- b) Leucoplasia idiopática. (por ej. en no fumadores)
- c) Presencia de Candida Albicans
- d) Localización en la mucosa bucal (en oposición al suelo de la boca o lengua)

**122.- ¿Cuál de las siguientes entidades no predispone a una neoplasia mesenquimal?**

- a) Artrogriposis congénita múltiple.
- b) HIV.
- c) Lipomatosis familiar.
- d) Esclerosis tuberosa.

**123.- La arteria cutánea poplítea lateral es el pedículo axial dominante del colgajo posterior de la pierna (posterior leg flap) ¿Cuál es su origen más frecuente?**

- a) Directamente de la arteria poplítea.
- b) Arteria sural lateral.
- c) Arteria sural medial.
- d) Tronco tibioperoneo.

**124.- La arteria que nutre fundamentalmente los colgajos osteocutáneos de la región inguinal es la arteria es la arteria ilíaca circumfleja profunda, ¿Cuál es su origen más frecuente?**

- a) Arteria epigástrica superficial.
- b) Arteria epigástrica profunda.
- c) Arteria femoral.
- d) Arteria ilíaca externa.

**125.- ¿Cómo se denomina el trastorno obsesivo-compulsivo en el que el paciente aqueja picor constante y ficticio de la piel, así como la necesidad imperiosa de rascado, habitualmente hasta la producción de lesiones cutáneas autoinfligidas?**

- a) dermatilomania
- b) dermatotilexomania
- c) ictomania
- d) A y B son correctas

**126.- El asa de Drobnick forma parte del sistema simpático cervical. ¿A qué arteria rodea?**

- a) Arteria vertebral.
- b) Arteria transversa cervical.
- c) Arteria tiroidea inferior.
- d) Arteria laríngea superior.

**127.-Con respecto al melanoma:**

- a) Los tipos histológicos nodulares no tienen fase de crecimiento radial.
- b) El melanoma acral supone el 30% de todos los melanomas.
- c) El lentigo maligno es el subtipo más común.
- d) Los subtipos desmoplásicos son negativos para el marcador histológico S100.

**128.- ¿Cuál de los siguientes factores pronósticos del melanoma no está incluido en el sistema de estadiaje de la AJCC (American Joint Committee on Cancer)?**

- a) Ulceración.
- b) Índice mitótico.
- c) Micrometástasis en ganglios linfáticos.
- d) Lactatodeshidrogenasa (LDH).

**129.- ¿Que secuencia describe mejor la recuperación sensitiva en una zona con injerto de piel?**

- a) Temperatura, dolor, tacto ligero.
- b) Dolor, tacto ligero, temperatura.
- c) Tacto ligero, dolor temperatura.
- d) Temperatura. tacto ligero, dolor.

**130.- En relación a los colgajos escapulares y paraescapulares irrigados por la arteria circunfleja escapular, señale la respuesta incorrecta:**

- a) La rama infraescapular entra en la fosa subescapular profunda al musculo subescapular.
- b) La rama descendente emerge por el espacio triangular dividiéndose en las ramas cutáneas principales.
- c) El agujero triangular está situado en el borde lateral de la escápula.
- d) Se origina en la mayoría de las veces directamente de la arteria axilar.

**131.- Señale la técnica de mastopexia/reducción mamaria que conlleva una cicatriz en T acortada:**

- a) Marchac.
- b) Lassus.
- c) Regnault.
- d) Hall-Findlay.

**132.- El cirujano plástico es frecuentemente requerido para las úlceras por presión. Indique cual es la presión tisular mínima que determina el riesgo para desarrollar una úlcera.**

- a) 32 mmHg.
- b) 7 mmHg.
- c) 123 mmHg.
- d) 90 mmHg.

**133.- ¿Cuál de estos músculos situados en la nuca se extiende desde el tubérculo posterior del atlas al espacio cuadrilátero subyacente a la línea curva occipital inferior?**

- a) Recto posterior mayor de la cabeza.
- b) Recto posterior menor de la cabeza.
- c) Oblícuo mayor de la cabeza.
- d) Oblícuo menor de la cabeza.

**134.- Señale la hendidura de Tessier que afecta la nariz y la órbita:**

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

**135.- El artículo 4 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, establece definiciones de los principales conceptos en materia de igualdad de género, entendiendo por “representación equilibrada”:**

- a) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere el cuarenta por ciento ni sea menos del sesenta por ciento.
- b) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo suponga el cincuenta por ciento.
- c) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
- d) No establece ningún porcentaje, únicamente exige que se garantice la presencia de mujeres y hombres de forma equilibrada.

**136.- La Constitución Española de 1978 determina que el castellano es la lengua española oficial del Estado y añade que:**

- a) Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
- b) Todos los españoles tienen el derecho a conocerla y el deber de usarla.
- c) Todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocerla y usarla.
- d) Todos los españoles tienen el deber de conocerla, salvo en aquellas Comunidades Autónomas donde sus Estatutos establezcan lo contrario.

**137.- La igualdad reconocida en el artículo 14 de la Constitución Española de 1978 se establece sin que pueda prevalecer discriminación por razón de:**

- a) "Nacimiento, raza, religión, opinión, ideología o cualquier otra condición física o circunstancia personal o social."
- b) "Nacionalidad, religión, condición física o cualquier otra condición."
- c) "Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."
- d) La igualdad ante la ley no está reconocida en el artículo 14.

**138.- De conformidad con la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señale la respuesta CORRECTA:**

- a) Gozan de la condición política de extremeños los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales de la Comunidad Autónoma, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Extremadura.
- b) Son extremeños los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Extremadura y acrediten esta condición en la correspondiente representación diplomática de España.
- c) El escudo y el himno de Extremadura se regularán por decreto-Ley de la Asamblea aprobada por mayoría de dos tercios de los diputados.
- d) Las repuestas b y c son correctas.

**139.- Según se regula en la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la sanidad y la salud pública, la sanidad agrícola y animal, la sanidad alimentaria, son:**

- a) Uno de los principios rectores de los poderes públicos extremeños.
- b) Una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.
- c) Una competencia de desarrollo normativo y ejecución de la Comunidad Autónoma.
- d) Una competencia de ejecución de la Comunidad Autónoma.

**140.- Según el artículo 1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, el objeto del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud es:**

- a) Homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de los centros, instituciones o servicios de salud, con el fin de mejorar la eficacia en la gestión.
- b) El establecimiento de las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud del personal estatutario en materia de ordenación del tiempo de trabajo.
- c) Establecer las bases reguladoras de la relación funcional especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**141.- Uno de los siguientes NO se encuentra entre los principios y criterios de ordenación de régimen estatutario enumerados en el artículo 4 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud:**

- a) Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento de la condición de personal estatutario fijo.
- b) Dedicación prioritaria al servicio público y transparencia de los intereses y actividades privadas como garantía de dicha preferencia.
- c) Libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema de Salud de la Comunidad.
- d) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario.

**142.- El Capítulo II del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, efectúa distintas clasificaciones del personal estatutario, señale la CORRECTA:**

- a) Tanto el personal estatutario sanitario como el de gestión y servicios se clasifica, en función del título exigido para el ingreso, en personal de formación universitaria, personal de formación profesional y otro personal.
- b) El nombramiento interino es de carácter temporal indefinido y se acuerda el cese de este tipo de personal cuando se incorpore el personal fijo o temporal, por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza que desempeñe, así como cuando dicha plaza resulte amortizada o cuando se reincorpore la persona cuya ausencia cubra, en su caso.
- c) Por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, los servicios de salud podrán nombrar personal estatutario temporal.
- d) Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de acumulo de tareas o de sustitución.



**143.- ¿Cuál de los enunciados a continuación NO se encuentra entre los derechos individuales reconocidos al personal estatutario por el artículo 17 del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud?:**

- a) A recibir asistencia y protección de las Administraciones públicas y servicios de salud en el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones.
- b) A la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población.
- c) A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables.
- d) A la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas funciones.

**144.- Según el artículo 9 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público, o vinculados a él, de:**

- a) Sus obligaciones y responsabilidades.
- b) Sus competencias y deberes
- c) Sus derechos y recursos.
- d) Sus derechos y deberes

**145.- La Ley General de Sanidad al referirse a la Estructura del Sistema Sanitario Público señala que:**

- a) El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de las Comunidades Autónomas.
- b) El Sistema Nacional de Salud integra la mayoría de las funciones y prestaciones sanitarias que no son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud.
- c) El Sistema Nacional de Salud cuenta entre sus características fundamentales con que la financiación de las obligaciones derivadas de la Ley 14/1986, de 25 de abril, se realizará mediante recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios.
- d) Todas son correctas.

**146.- De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley General de Sanidad ¿cuál NO es una característica fundamental del Sistema Nacional de Salud?:**

- a) La extensión de sus servicios a toda la población.
- b) La consecución de altos estándares de investigación orientados a la promoción y mejora de la salud de toda la población.
- c) La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único.
- d) La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.

**147.- Según el artículo 11 de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, en el Sistema Sanitario Público de Extremadura se garantiza:**

- a) El derecho a disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios recibidos.
- b) El derecho a recibir respuesta, siempre de carácter oral, en caso de utilizar los procedimientos de reclamación y sugerencias.
- c) El derecho a obtener una segunda y tercera opinión médica, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
- d) El derecho a disponer, en todo caso, de habitación individual en los centros hospitalarios.

**148.- Según la Ley de Salud de Extremadura, señale la respuesta INCORRECTA en relación con el Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura:**

- a) Desempeñará sus funciones con plena autonomía e independencia.
- b) Podrá actuar de oficio o a instancia de toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
- c) Dará cuenta de sus actividades anualmente a la Comisión de Política Social de la Asamblea de Extremadura y al Consejo Extremeño de Salud.
- d) Será designado por el Presidente de la Junta de Extremadura a propuesta del Consejo Extremeño de Salud por un periodo de cinco años.

**149.- Según el Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, la aprobación del anteproyecto del presupuesto anual del S.E.S. es una función propia de:**

- a) El Director Gerente.
- b) El Secretario General.
- c) El Director General de Presupuesto y Tesorería.
- d) El Director General de Asistencia Sanitaria.

**150.- Según los Estatutos del Servicio Extremeño de Salud, indique con que periodicidad debe reunirse el Consejo General del Servicio Extremeño de Salud en sesiones de carácter ordinario:**

- a) Quincenalmente.
- b) Mensualmente.
- c) Al menos trimestralmente.
- d) Al menos Semestralmente

### **PREGUNTAS ADICIONALES**

**SUPLENTE 151.- La arteria submental aporta la vascularización fundamental para el colgajo submental. Señale la respuesta correcta:**

- a) Nace de la arteria facial justo antes de que ésta pase bajo el vientre posterior del digástrico.
- b) Tiene un trayecto casi horizontal bajo el milohioideo.
- c) Da algunas ramas para irrigar el platisma.
- d) Todas son correctas.

**SUPLENTE 152.- Los primeros intentos de reconstrucción mamaria tuvieron lugar a finales del siglo XIX, ¿qué cirujano empleó parte de una mama sana, transferida sobre un pedículo superior, para reconstruir la otra.?**

- a) Verneuil
- b) Dieffenbach
- c) Pontes
- d) Czerny

**SUPLENTE 153.- ¿Cuál de las siguientes características no está asociada con el hipospadias?**

- a) Bipartición escrotal.
- b) Hernia inguinal y testículos no descendidos.
- c) Hipersensibilidad androgénica.
- d) Ambiente estrogénico.

**SUPLENTE 154.- Señale el músculo del paladar blando inervado por el V par craneal.**

- a) Tensor del velo del paladar.
- b) Palatogloso.
- c) Palatofaríngeo.
- d) Periestafilino interno.

**SUPLENTE 155.-¿Cuál es el nombre del punto craneométrico más anterior de la mandíbula?**

- a) Pogonio
- b) Gnation
- c) Prognation
- d) Pregnation

**SUPLENTE 156.-¿En qué radiografía el rayo central discurre perpendicularmente al plano horizontal transversal, pudiendo atravesar el cráneo tanto en dirección vértex-submentón como submentón-vértex?**

- a) Schuller.
- b) Rhese.
- c) Chausse.
- d) Hirtz.

**SUPLENTE 157.-Señale lo incorrecto en el Pseudoxantoma elástico:**

- a) Herencia autosómica dominante.
- b) Piel gruesa y laxa en flexuras y zonas de roce.
- c) La mucosa oral se afecta con frecuencia.
- d) Calcificaciones subcutáneas.

**SUPLENTE 158.- Ante la sospecha de craneosinóstosis, ¿qué sutura craneal es preciso tener en cuenta por su mayor frecuencia de fusión prematura?.**

- a) Lambdoidea.
- b) Coronal.
- c) Metópica.
- d) Sagital.

**SUPLENTE 159.-Señale lo incorrecto respecto a la lipomatosis simétrica múltiple.**

- a) También es conocida como enfermedad de Madelung.
- b) Afecta más a los varones.
- c) Es más frecuente en los países mediterráneos que en los nórdicos.
- d) La mayoría de los casos son de herencia autosómica.

**SUPLENTE 160.- Señale la afirmación correcta con respecto a la cicatrización cutánea:**

- a) La epitelización en el cierre primario se produce a los cuatro días.
- b) A los cinco días de la reparación, las células predominantes son los neutrófilos.
- c) En la cicatriz inmadura predomina el colágeno tipo III.
- d) La resistencia elástica de la cicatriz es idéntica a la situación inicial pasados 12 meses.

**SUPLENTE 161.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al Personero del Común, según se regula en la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es CORRECTA?:**

- a) Es una institución estatutaria dotada de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.
- b) Una Ley de la Asamblea regulará su composición, competencias, organización y funcionamiento.
- c) Se creará como comisionado del Consejo Consultivo de Extremadura.
- d) Deberá ser elegido por 3/5 partes de los miembros de la Junta de Extremadura.

**SUPLENTE 162.- El artículo 57 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad establece que las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con ciertos órganos, señale la respuesta CORRECTA:**

- a) De dirección: Director de área.
- b) De gestión: Coordinador de área.
- c) De participación: Consejo consultivo de área.
- d) De dirección: Consejo de Dirección de Área.